

# ácido fusídico + valerato de betametasona



## FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Creme dermatológico. Embalagem contendo bisnagas de 5g, 15g, 30g ou 60g.

## USO ADULTO E PEDIÁTRICO USO TÓPICO

### COMPOSIÇÃO

Cada grama do creme dermatológico contém:

ácido fusídico hemi-hidratado\* .....20,35 mg  
valerato de betametasona\*\* .....1,2 mg  
excipiente\*\*\* q.s.p. ....1g

\* 20,35 mg de ácido fusídico hemi-hidratado equivale a 20,00 mg de ácido fusídico

\*\* 1,2 mg de valerato de betametasona equivale a 1,0 mg de betametasona

\*\*\* álcool cetosteárilico, petrolato líquido, álcool cetosteárilico etoxilado, metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de sódio, simeticona, propilenoglicol, oleato de decila, fosfato de sódio dibásico, água purificada.

### INFORMAÇÃO AO PACIENTE

Solicitamos a gentileza de ler cuidadosamente as informações abaixo. Caso não esteja seguro a respeito de determinado item, favor informar ao seu médico.

O ácido fusídico + valerato de betametasona só deve ser usado quando receitado por um médico. O creme pode ser aplicado diretamente sobre a lesão da pele utilizando-se a extremidade de um dos dedos. Deve ser aplicado em camada fina. Nunca aplique perto dos olhos.

### Ação esperada do medicamento

O ácido fusídico + valerato de betametasona contém em sua fórmula uma substância que age na pele, o ácido fusídico, pertencente ao grupo de medicamentos chamados de anti-infecciosos de uso externo, sendo capaz de combater doenças infecciosas da pele, associado a um esteróide, o valerato de betametasona (*este esteróide não deve ser confundido com esteróides anabolizantes usados imprópriamente por alguns fisicultores*). O ácido fusídico + valerato de betametasona age reduzindo o edema (inchaço), urticária e vermelhidão como também eliminando a bactéria causadora da infecção da pele.

### Cuidados de armazenamento

Manter a bisnaga tampada, à temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da luz e manter em lugar seco.

### Prazo de validade

O número de lote e as datas de fabricação e validade estão impressos no cartucho. Não utilize medicamento com o prazo de validade vencido.

### Gravidez e lactação

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informe ao médico se está amamentando. Você não deverá amamentar durante o tratamento com ácido fusídico + valerato de betametasona.

### Cuidados de administração

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

O creme pode ser aplicado diretamente sobre a lesão da pele utilizando-se a extremidade de um dos dedos. Deve ser aplicado em camada fina. Nunca aplique perto dos olhos.

### Interrupção do tratamento

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

### Reações adversas

Informe ao seu médico sobre o aparecimento de reações desagradáveis. Caso surjam coceira, vermelhidão ou outros sinais de irritação após o uso do medicamento, suspenda seu uso e informe imediatamente a seu médico.

### TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

### Contraindicações e precauções

Você não deverá usar se for alérgico ao ácido fusídico + valerato de betametasona ou a qualquer substância contida no creme.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

O ácido fusídico + valerato de betametasona não deve ser utilizado para tratar condições de pele

068942

causadas somente por bactérias, isto é, manchas e bolhas; por vírus, ou seja, catapora/varicela e herpes simples; e por fungos, por exemplo, pé-de-atleta. Também deve ser utilizado para tratar acne, rosácea ou um tipo de dermatite com manchas em torno da boca e queixo.

**NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.**

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

#### Características químicas e farmacológicas

O ácido fusídico + valerato de betametasona combina a ação antibacteriana do ácido fusídico, que atua de forma eficaz contra o estafilococo, inclusive sobre cepas resistentes à penicilina, e o estreptococo; com o efeito anti-inflamatório e antipruriginoso de um esteróide de mediana potência, como o valerato de betametasona.

#### Indicações

O ácido fusídico + valerato de betametasona está indicado no tratamento das dermatoses inflamatórias, nas quais existe ou possa existir uma infecção bacteriana, como: eczema atópico, eczema discóide, eczema por estase, dermatite seborréica, dermatite de contato, líquen simples crônico e picadas de insetos.

#### Contraindicações

O ácido fusídico + valerato de betametasona está contraindicado em infecções cutâneas causadas somente por bactérias, por vírus ou por fungos e em pacientes com reconhecida reação de hipersensibilidade aos componentes ativos da fórmula.

#### Precauções e advertências

Deve-se evitar o contato do ácido fusídico + valerato de betametasona com os olhos, pois pode provocar irritação conjuntival.

#### Gravidez e lactação

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informe ao médico se está amamentando. Você não deverá amamentar durante o tratamento com ácido fusídico + valerato de betametasona.

#### Interações medicamentosas

Desconhecidas até o momento.

#### Reações adversas

Ainda não são conhecidas a intensidade e frequência das reações adversas. Em pacientes hipersensíveis é possível o aparecimento de irritação transitória (eritema e prurido).

#### Posologia

O ácido fusídico + valerato de betametasona deve ser aplicado sobre a área afetada, 2 a 3 vezes ao dia. Seu médico prescreveu ácido fusídico + valerato de betametasona para sua condição individual de pele. O creme é usado para tratar condições de pele inflamada e dependendo do estado individual, a frequência e dosagem poderão ser alteradas.

#### Superdosagem

Ainda não foi descrita superdosagem com este medicamento.

#### Pacientes idosos

A critério médico, dependendo do estado individual, a frequência e dosagem poderão ser alteradas.

### VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA

Reg. MS: nº 1.0235.0952  
Farm.Resp.: Dr. Ronoel Caza de Dio  
CRF-SP nº 19.710

#### EMS S/A.

Rod. Jornalista F. A. Proença, km 08  
Bairro Chácara Assay  
Hortolândia/SP – CEP 13186-901  
CNPJ: 57.507.378/0003-65  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

"Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE: VIDE CARTUCHO".

### APROVAÇÃO DE ARTE FINAL

ÁREA	VISTO	DATA
Desenv. Embalagem	_____	_____
Depto. Marketing	_____	_____
Desenv. Galênico	_____	_____
Registro de Produto	_____	_____

BU-1891 / LAETUS-204

**SAC 0800-191914**  
www.ems.com.br