

aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.  
Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de atendimento ao Consumidor (SAC).

### 9. O QUE DEVO FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Até o momento não existe relato de superdosagem. Caso isso ocorra, lave o local da aplicação, removendo todo o medicamento, e procure orientação médica.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**

### DIZERES LEGAIS

Farm. Resp.: Dr. Ronoel Caza de Dio  
CRF-SP nº 19.710  
Reg. M.S. nº 1.0235.0106

### EMS S/A.

Rod. Jornalista F. A. Proença, km 08  
Bairro Chácara Assay  
Hortolândia - SP – CEP: 13.186-901  
CNPJ: 57.507.378/0003-65  
INDÚSTRIA BRASILEIRA



083804

# Frixopel®



essência de terebentina, salicilato de metila, cânfora, mentol

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Gel - Bisnaga com 25 g.

### USO TÓPICO

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

### COMPOSIÇÃO

Cada grama do gel contém:

essência de terebentina.....0,2222 mL  
salicilato de metila .....0,0444 mL  
cânfora .....0,0444 g  
mentol .....0,098 g  
excipiente q.s.p. ....1 g  
(carbômer 934, trolamina, polissorbato 80, água purificada)

### 1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é destinado para auxiliar no tratamento tópico dos sintomas de reumatismos (doença que afeta as articulações, músculos e esqueleto), nevralgias (inflamação nos nervos), torcicolos, contusões e dores musculares.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O medicamento tem ação local, proporcionando alívio da dor, responsáveis pelos efeitos analgésicos (alívio da dor), anestésicos (leve anestesia local) e de dilatação local, produzidos pelos componentes da fórmula.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado em pacientes que apresentam hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

**Este medicamento é contra-indicado para menores de 2 anos de**

BU-90 / LAETUS-44

### Código do Material: 083804

Dimensões:.....240 x 162 mm	Programa: QuarkXpress (MAC)
Material: .....Papel sulfite 56 g/m <sup>2</sup>	Prova nº:02 FINAL
Cor Pantone: Process Black C	Designer:Fabiano
Nº da Arte: ....BU-90	
LAETUS:.....44	<b>EMS/SIMILAR</b>

Times 10  
esp. 12

### APROVAÇÃO DE ARTE FINAL

ÁREA	VISTO	DATA
Desenv. Embalagem	_____	_____
Depto. Marketing	_____	_____
Desenv. Galênico	_____	_____
Registro de Produto	_____	_____



idade.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso ocorra erupções (lesão) ou irritações da pele, suspender o uso deste medicamento.

Evitar a área dos olhos ou membranas mucosas (boca).

Este medicamento não deve ser utilizado em feridas abertas.

**Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Manter a bisnaga tampada, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), proteger da luz e manter em lugar seco.

**O número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido.**

**Para sua segurança, mantenha o medicamento na sua embalagem original.**

Este medicamento é um gel homogêneo de coloração branca e odor característico.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento**

**que ainda esteja no prazo de validade, consultar o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Limpar a área afetada com água e sabão.

Aplicar o medicamento 2 a 3 vezes ao dia, em toda a região afetada, e em pequena quantidade. Em seguida, envolver a região com um pano de flanela ou lã.

**Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as dose e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvida sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso se esqueça de usar o medicamento, faça a aplicação antes da próxima.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Até o momento não existem relatos de interações medicamentosas com o uso deste medicamento.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o**

